



果樹・野菜・茶・花のハダニ防除に!

# ガブリー発! 適用拡大!


いちごの使用回数が  
2回になりました!



ハダニの全ステージで速く効く

# ピラニカ® EW

ピラニカ®は日本農薬(株)の登録商標です。



ハダニの全ステージで速く効く

# ピラニカ® EW

®は日本農薬協会の登録商標です。

農林水産省登録 第18345号

有効成分：テブフェンピラド…10%

毒性：医薬用外劇物

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤及びテブフェンピラドを含む農薬の総使用回数	使用方法	
なす	チャノホコリダニ	2,000	150~300	収穫前日まで	1回	散布	
	ハダニ類	2,000~3,000					
いちご	アブラムシ類	2,000	200~700	収穫3日前まで	2回以内		
	うどんこ病						
すいか	ハダニ類	2,000~3,000	150~300	収穫14日前まで	1回		
メロン							
もも		1,000~2,000	200~400	摘採21日前まで			
おうとう							
きゅうり		アブラムシ類	2,000	150~300			収穫前日まで
		アブラムシ類	2,000				
あずき	ハダニ類	1,000~2,000	200~400	収穫7日前まで			
茶	カンザワハダニ	2,000					
		チャノミドリヒメヨコバイ	1,000	200~700	発生初期		
しきみ	サビダニ類	1,000					
花き類・観葉植物(カーネーション・きくを除く)	ハダニ類	2,000	150~300	発生初期	1回		
		カーネーション				1,000~2,000	
きく	アブラムシ類	1,000	2,000	2回以内			
やなぎ	ハダニ類	2,000					
ほおずき	チャノホコリダニ	2,000					

## △ 効果・薬害等の注意

- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番(ローテーション)で使用してください。
- バラの新展開業に薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
- さつきに薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## △ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布液調製時及び散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。



## ■ 特長

### 1. 各種ハダニに優れた効果

ナミハダニ・カンザワハダニなど、ハダニの種類を問わず優れた効果を発揮します。

### 2. ハダニの全発育ステージに高い効果

ハダニの卵・幼虫・若虫・成虫の、すべてのステージに高い効果を発揮します。

### 3. 優れた速効性

ハダニ類に対して速効的に効果を発現します。

### 4. 安定した効果

気温の影響を受けることなく、いつでも安定した効果を発揮します。

### 5. 有益昆虫に影響が少ない

ミツバチ・マルハナバチなど、有益昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

### 6. 各種の殺菌剤・殺虫剤との混用が可能です。

### 7. 作物に対する薬害の心配が少ない薬剤です。



水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★小児の手の届く所には置かないでください。★使用後の空容器等は圃場などに放置せずに適切に処理してください。

※この資料は2010年6月現在の知見に基づき作成したものです。



# 日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084

ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>

大阪支店 ☎(06)6229-7343 東京営業所 ☎(03)3279-6961

札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003

仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336

信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315