

ドリフトの
少ない粉剤に
生まれ
変わりました。


さらに
使いやす
くなった!



トップジンM粉剤DL

日本曹達(株)保有地での散布試験

稲・麦類・だいず・らっかせい・こんにゃく・ねぎ・ごぼうの病害防除に!



殺菌剤

トップジン[®]M 粉剤DL

殺菌剤 トップジンM[®] 粉剤DL

- 有効成分：チオファネートメチル…2.0%
- 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
- 包装：3kg×8袋

特長


- 1 チオファネートメチルを有効成分とする粉剤タイプの殺菌剤で、病害の予防、治療効果に優れます。
- 2 ドリフトレス（DL）タイプの粉剤で、従来品に比べ粉立ちや飛散が大幅に軽減され、作業者に対する安全性が一段と高まっています。
- 3 周辺作物へのドリフトも大変少なく、ポジティブリスト制度対策に有効です。
- 4 植物体への付着性能も従来品と同等以上で、安定した病害防除効果を示します。
- 5 有効成分のチオファネートメチルは、多くの作物に対し使用されています。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数	使用方法
稲	いもち病	3～4kg/10a	収穫 14日前まで	3回以内	3回以内 (種子への処理は1回以内)	散布
小麦	赤かび病	4kg/10a		3回以内 (出穂期以降は2回以内)	4回以内 (種子への処理は1回以内、 散布および無人ヘリ散布は 合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	
麦類 (小麦を除く)				3回以内 (出穂期以降は1回以内)	3回以内 (種子への処理は1回以内、 出穂期以降は1回以内)	
だいず				紫斑病	4回以内 (種子への処理は1回以内)	
らっかせい	褐斑病		収穫 7日前まで	4回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は4回以内)	
こんにゃく	乾腐病	種いも重量の2～3%	植付前	1回	1回	種いも粉衣
ねぎ	小菌核腐敗病	9kg/10a	収穫 7日前まで	3回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、苗根部浸漬 および苗床灌注は合計1回以内、 散布および株元散布は合計3回以内)	株元散布 (散布後 土寄せ)
ごぼう	菌核病	3kg/10a			4回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は3回以内)	散布

●小麦赤かび病およびDONに対する効果

平成17年 九州沖縄農研センター（圃場）



●品種：チクゴイズミ ●発生条件：多発生、接種（4/25、5/2 F.graminearum） ●散布：4/22（1回目、開花始め）、4/28（2回目） ●調査：5/13（開花21日後） ●コメント：トップジンM粉剤DLは防除効果、マイコキシン効果とも、対照剤と比較して同等の高い効果が認められた。散布時のドリフトは、明らかに対照剤よりも少なかった。薬害は認められなかった。

⚠ 効果・薬害等の注意

- できるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散布機の開度を1目盛程度絞って散布してください。
- だいずの紫斑病に対しては、落花後～若英期に2～3回散布してください。
- こんにゃくの種いも粉衣を行なう場合は、適当な容器の中で本剤が均一に種いもに粉衣するよう少量づつていねいにまぶしてください。湿粉衣はさけ、粉衣した種いもはそのまま植付してください。なお、薬剤処理した種いもは、食料、食品として用いないよう十分注意してください。
- 過度の連用をさせ、作用性の異なる薬剤と組み合わせで輪番で使用してください。（薬剤耐性菌出現回避）
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤を散布した稲わらは家畜の飼料に使用しないでください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害

の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意してください（弱い刺激性）。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物への影響	通常の使用方法では問題ありません。
保管	密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
 ☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084
 ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>
 大阪支店 ☎(06)6229-7343 東京営業所 ☎(03)3279-6961
 札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003
 仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336
 信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315