

は種前(床土混和)・は種時処理専用剤



長期持続型殺虫殺菌剤

Powered by
DuPont[®]
RYNAXYPYR[®]
insecticide

農林水産省登録
第22824号

ファースト オリゼ[®] フェルテラ[®]

粒剤

は種前
(床土混和処理)
に適用拡大

クロラントラニリプロール・プロベナゾール粒剤

ファーストオリゼ[®]はMeiji Seika ファルマ(株)の登録商標 フェルテラ[®]、RYNAXYPYR[®]は米国デュポン社の登録商標

は種と同時にいもち病・害虫のW防除。

ファーストオリゼフェルテラ粒剤の特長

- 経済性—「は種前(床土混和)」または「は種時」に処理するため、こぼれ落ちがなく、薬剤が無駄になりません。
- 効 果—均一に処理されるため、撒きむらがなく、薬効が安定します。
- 省力性—忙しい田植時の労力を軽減できます。



本剤は「は種前(床土混和)」または「は種時」処理専用剤です。

は種と同時にいもち病・害虫のW防除。
ダブル



有効成分：クロラントラニリプロール……0.75% プロペナゾール……20.0% 人畜毒性：普通物※ ※毒物に該当しないもの指している通称

ファーストオリゼ フエルテラ粒剤の特長

1 「は種前(床土混和)」または「は種時」処理で水稻の主要病害虫の同時防除が可能
「は種前(床土混和)」または「は種時」処理により水稻の主要病害虫であるいもち病、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ等を同時に防除できます。

2 高い省力性
「は種前(床土混和)」または「は種時」処理で主要病害虫に対して長期間にわたって高い効果を示しますので、省力的、経済的です。

3 ユニークな作用性
いもち病防除剤「ファーストオリゼ」はイネの病害抵抗性を誘導し、安定した防除効果が長期間持続します。また、各種薬剤耐性菌にも有効です。「フェルテラ」はこれまでのどの殺虫剤グループにも属さない、まったく新しい基本骨格をもつ殺虫剤で、主要な水稻害虫に対して低薬量で優れた効果を発揮します。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	プロペナゾールを含む農薬の総使用回数
稻 (箱育苗)	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5L) 1箱当たり 50g	は種前	1回	育苗箱の床土に 均一に混和する	1回	2回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内)
	もみ枯細菌病 白葉枯病		は種時 (覆土前)		育苗箱の床土に 均一に散布する		



使用上の注意

- 本剤を育苗床土に混和する場合には薬害を生じる場合があるので、下記の注意事項を遵守してください。
 - ①山土、畑土などを使用する場合は、十分に乾燥させてから使用してください。
 - ②粒剤を混和した床土は高温多湿での保管を避け、すみやかに使用してください。
 - ③粒剤が破碎されるような過度な混和はさけてください。
- 本剤処理後の低温で生育抑制を生じる恐れがあるので温度管理に注意し、適切な育苗につとめてください。
- 本剤の処理により、軽度の初期生育遅延や葉の黄化を認めることがあります、その後回復するので通常の管理を維持してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出したりしないよう水管理に注意してください。
- 本田が砂質土壤の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合は使用をさけてください。
- 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 誤食などの注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体质の人は、作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
- 夏期高温時の使用を避けてください。
- 河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください(甲殻類)。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

1. 使用前にラベルをよく読んでください。

2. ラベルの記載以外には使用しないでください。

3. 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

4. 使用後の空袋は圃場や用水路などに放置せず、適切に処理してください。

お問い合わせ／ご注文は

meiji Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2-4-16

<http://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>